

Recomandări pentru prevenția cancerului de col uterin

- 1** Se recomandă screeningul pentru cancerul de col uterin prin testare (Babes –Papanicolau) pentru toate femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 65 ani care nu au simptome sugestive sau un diagnostic confirmat de cancer de col uterin și nu sunt histerectomizate total pentru afecțiuni necanceroase . **1A**
- 2** Retestarea în cadrul Programului National de Screening al Cancerului de Col Uterin în România are loc la 5 ani după ultimul rezultat normal . **1A**
- 3** Medicul de familie va recomanda testarea tuturor femeilor eligibile cu vârsta între 25-64 ani pentru care nu se poate documenta un rezultat normal mai recent de 5 ani. **PP**
- 4** Medicul de familie va explica pacientei semnificația rezultatului testării și conduita de urmat. **1A**
- 5** În cazul unui rezultat nesatisfăcător sau al unui rezultat negativ pentru leziuni intraepiteliale sau malignitate, dar cu modificări non-neoplazice (infecții, inflamații sau alte modificări reactive), Se recomandă repetarea testului într-un interval de 3-6 luni. **1A**
- 6** În cazul unui rezultat pozitiv pentru anomalii ale celulelor epiteliale sau glandulare recomandarea generală este trimiterea la ginecolog / oncolog pentru evaluare și intervenție de specialitate. **1A**
- 7** În cazul specific al unor modificări ce indică prezenta de Celule Scuamoase Atipice cu Semnificație Neprecizată (ASC-US) sau a unei Leziuni Scuamoase Intraepiteliale de Grad Scăzut (LSIL) există opțiunea repetării testului la 6 luni. **2B**
- 8** În cazul persistenței modificărilor se recomandă trimiterea la ginecolog / oncolog pentru evaluare și intervenție de specialitate.
- 9** Un episod de screening pentru cancerul de col uterin se încheie fie cu reintroducerea în Programul de Screening pentru screening de rutină (o dată la 5 ani) fie cu confirmarea diagnosticului de cancer. **1A**
- 10** Reintroducerea în Programul de screening (o dată la 5 ani) a femeilor care au prezentat anomalii de tip displazic ale celulelor scuamoase sau glandulare se realizează după obținerea a 3 frotiuri consecutive negative la intervale de 6 luni. **1B**
- 11** Medicii de familie vor informa părinții și tinerii despre beneficiile vaccinării anti HPV pentru prevenția primară a cancerului de col uterin și a altor cancere determinate de HPV . **1A**
- 12** Vaccinarea se recomandă persoanelor de sex feminin la vârsta de 11-12 ani și până la 26 ani celor care nu au fost vaccinate anterior sau nu au completat cele 3 doze. 9vHPV și 4vHPV pot fi folosite și pentru vaccinarea persoanelor de sex masculin în aceleași condiții. **1B**
- 13** Screeningul cancerului de col uterin prin testare Babes-Papanicolau se recomandă atât femeilor vaccinate cât și celor nevaccinate **1C**