

Programul național de imunizări

2-7 zile	Vaccin hepatitic B (Hep B), Vaccin de tip Calmette Guerin (BCG)	în maternitate
2 luni	Vaccin diftero-tetano - pertussis acelular -poliomielitic - Haemophilus B - hepatitic B (DTPa-VPI - Hib - Hep.B) Vaccin pneumococic conjugat ¹⁾	medicul de familie
4 luni	Vaccin diftero-tetano - pertussis acelular -poliomielitic - Haemophilus B - hepatitic B (DTPa -VPI - Hib - Hep.B) Vaccin pneumococic conjugat ¹⁾	medicul de familie
11 luni	Vaccin diftero-tetano - pertussis acelular -poliomielitic - Haemophilus B - hepatitic B (DTPa -VPI - Hib - Hep.B) Vaccin pneumococic conjugat ¹⁾	medicul de familie
12 luni	Vaccin rujeolic - rubeolic - oreion (ROR)	medicul de familie
5 ani ,7 ani	Vaccin rujeolic - rubeolic - oreion (ROR)	medicul de familie
6 ani [^]	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular -poliomielitic (DTPa - VPI / VPI ²⁾)	medicul de familie
8 ani ³⁾	Vaccin poliomielitic inactivat (VPI ³⁾)	medicul de familie
14 ani	Vaccin diftero-tetanic pentru adulți / vaccin diftero-tetano - pertussis acelular (dT / DTPa)	medicul de familie

Notă:

1. Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus în calendarul național de vaccinare în funcție de fondurile disponibile
2. Copiii cu vârsta de 6 ani care au în antecedentele vaccinale o doză de DTPa la 4 ani vor fi vaccinați cu VPI, iar cei care nu au în antecedentele vaccinale o doză de DTPa vor fi vaccinați cu DTPa - VPI.
3. Copiii cu vârsta de 8 ani care au în antecedentele vaccinale o doză de DTPa la 4 ani vor fi vaccinați cu VPI în 2015 (copiii care nu au fost școlarizați în clasa pregătitoare). Această recuperare se aplică numai în anul 2015.